

HJORTEVILDETS ÅRSCYKLUS

Brunst

Brunst er parringssæsonen, hvor dyrene viser øget seksuel adfærd og konkurrerer om at formere sig. Det er en vigtig del af den reproduktive cyklus og har betydelige effekter på både dyret selv og dets omgivelser.

Parringsadfærden er kompleks og involverer forskellige rutiner og konkurrence mellem hannerne – De udviser territoriale adfærdsmønstre og konkurrerer om hunnernes opmærksomhed.

Hunnerne bliver mere modtagelige for parring og kan vise interesse for flere hanner.

Hunnerne

Drægtig

Efter en succesfuld parring går hunnen ind i en drægtighedsperiode, hvor hun udvikler fosteret. Denne periode varer imellem 7–8 måneder, hvorefter hunnen typisk føder en enkelt kalv.

Fødsel

Efter fødslen er kalven afhængig af sin mor for at overleve. Hunnen sørger for at give kalven mælk og beskytte den mod rovdyr. Kalven vokser hurtigt og begynder at udforske sine omgivelser efter få uger.

Hannerne

Geviret kastes

Hannerne kaster deres gevir årligt, hvorefter en ny cyklus med vækst og fejning begynder.

Geviret i vækst

Geviret vokser ud fra rosenstokkene, som er de bentapper der, sidder på dyrets pandeben. Kun hannerne har gevir.

Geviret fejes

Når hannerne fejer deres gevir, gnider de det nyudvoksede, bastklædte gevir mod træer og buske for at fjerne den sidste rest af hud. Det kan se blodigt og voldsomt ud, når hjortene fejer basten af, men det er en naturlig proces. Det sker typisk i sensommeren, så geviret kan være klar til brunstperioden.

